

## **TIPS FRA TANDLÆGEN**

### **Efter rodbehandling**

En rodbehandling forløber normalt uden komplikationer. Der kan dog forekomme ømhed de første par dage.

**Smertes.** Ved de fleste rodbehandlinger er der tale om betændelse i tandens nerve. I enkelte tilfælde er det ikke har været muligt at skylle denne betændelse helt ud, hvilket kan resultere i kraftige smerter og hævelse. I disse situationer bør du kontakte klinikken, da det kan blive nødvendigt at give smertestillende og evt. antibiotika.

Hvis der opstår kraftige smerter kan følgende håndkøbsmedicin anvendes:  
600mg Ibuprofen (3x 200 mg) max 4 pr. døgn  
1 gram panodil max, 4 pr. døgn

Du skal allerede nu vide, at alle rodbehandlede tænder bliver sprøde med tiden. Derfor er risikoen for at de knækker i over 50 % af tilfældene.

Hvis de knækker kan det ske på en måde, så tanden ikke kan reddes, men på trækkes ud. Det anbefales derfor, at man for påsat en krone efter en observationstid, der varer fra 3 måneder til 1 år efter rodbehandlingens afslutning.

Du skal regne med at der udover en krone også skal fremstilles en opbygning, hvorved vi stiver tanden af med en stift i en eller flere af tandens rodkanaler.

